

REINICI DE LA DEGLUCIÓ

NºHC:

INDICACIONS

Pacient en alerta i atenció
 Segueix ordres verbals
 Moviment voluntari de llavis, llengua, paladar i mímica facial
 Mobilitat cervical i d'adoptar postura de seguretat
 Capacitat de maneig de la saliva

CONTRAINDICACIONS

Incapacitat de seguir ordres verbals
 Incapacitat de maneig de la saliva
 Incapacitat de mantenir cànula desinflatada.
 Incapacitat mantenir posició de seguretat per ingesta.
 Presència clínica d'aspiracions.
 Presència clínica de disfàgia o odinofàgia.

Quan compleix les indicacions i no presenta contraindicacions, iniciem la prova de la ingesta oral (Test de MECV-V)

Pacient en posició de seguretat per l'alimentació. Cànula interna i externa fenestrada i baló desinflat si en porta

Cal fer la comprovació en els minuts inicials i de manera diferida

Per més seguretat monitoritzar la Sat d'O2

VISCOSITAT NÈCTAR	Volum administrat			
	/	/		
Presenta tos a l'ingerir?	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Escassa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bastant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aturem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Surt aliment per la cànula o voltant de l'estoma?	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Escàs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bastant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aturem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si aspirem o tus surt aliment?	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Escàs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bastant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aturem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incapacitat de deglució sense problemes. Avisar a logopeda <input type="checkbox"/>				

VISCOSITAT LÍQUIDA	Volum administrat			
	/	/		
Presenta tos a l'ingerir?	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Escassa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bastant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aturem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Surt aliment per la cànula o voltant de l'estoma?	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Escàs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bastant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aturem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si aspirem o tos surt aliment?	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Escàs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bastant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aturem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incapacitat de deglució sense problemes. Avisar a logopeda <input type="checkbox"/>				

VISCOSITAT PUDIN	Volum administrat			
	/	/		
Presenta tos a l'ingerir?	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Escassa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bastant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aturem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Surt aliment per la cànula o voltant de l'estoma?	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Escàs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bastant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aturem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Si aspirem o tos surt aliment?	No	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Escàs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bastant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aturem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incapacitat de deglució sense problemes. Avisar a logopeda <input type="checkbox"/>				

DATA DE LA PROVA D'INGESTA

En quin volum ha presentat problemes? (Si és el cas)

5ml

10ml

20ml

Tipus viscositat:

TEST MECV-V

Per realitzar el test el pacient ha d'estar amb una **cànula interna i externa fenestrada i el baló desinflat si en porta.**

Per realitzar de manera correcta el test s'han d'administrar totes les quantitats (5, 10 i 20 ml) en tres textures diferents (nèctar, líquid i púding).

FASES DEL TEST

1. Iniciar la ingesta de 5 ml d'aigua en textura nèctar. Afegir 1 cullerada (4,5 gr) d'espessant a 100ml d'aigua i 2 gotes de blau de metilè, dissoldre i esperar 2 minuts abans d'administrar, per tal d'aconseguir la consistència adequada.
 - Si la deglució és correcte augmentarem el volum a 10ml i si continua sent correcta augmentarem a 20ml.
 - Si objectivem aspiracions amb la textura nèctar provarem directament amb la textura púding sense provar la textura líquida.
2. Si la deglució en textura nèctar és correcte provarem amb el líquid. Afegir 2 gotes a 100ml d'aigua i iniciem la progressió com en la textura nèctar.
3. Finalment si el pacient ha superat amb èxit la textura nèctar i líquida provarem la textura púding. Afegir 2 cullerades d'espessant en 100ml d'aigua i 2 gotes de blau de metilè, dissoldre i esperar 2 minuts. Descartarem disfàgia a sòlids.

