	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment d'actuació COVID. Protocol de desaïllament hospitalari de pacients COVID positiu o considerats contacte estret. Propera revisió: octubre 2024	CSPT-COV-027	14/10/2020		Pàg. 1 de 4

## PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ COVID. PROTOCOL DE DESAÏLLAMENT INTRAHOSPITALARI DE PACIENTS COVID POSITIU O CONSIDERATS CONTACTE ESTRET

ELABORAT PER:	REVISAT PER:	APROVAT PER:
Marta Navarro Vilasaró. Directora de Servei de Malalties Infeccioses. Manuel Cervantes Cervantes. President del Comitè d'Infeccioses	Comitè de Direcció	Comitè Executiu COVID Maria Reventós Gil de Biedma. Coordinació
10/12/2020	11/12/2020	11/12/2020

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment d'actuació COVID. Protocol de desallament hospitalari de pacients COVID positiu o considerats contacte estret. Propera revisió: octubre 2024	CSPT-COV-027	14/10/2020		

## ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ .....	3
2. DESAÏLLAMENT DELS PACIENTS COVID POSITIU I /O TRASLLAT A ALTRES ÀREES DE L'HOSPITAL.....	3
3. DESAÏLLAMENT DE PACIENTS ASSIMPTOMÀTICS CONTACTE ESTRET DE PACIENT COVID POSITIU .....	4
4. CRIBRATGE EN PREOPERATORI DE PACIENT POSTCOVID .....	4
5.-CRIBRATGE EN PACIENTS POSTCOVID QUE INGRESSEN A UNITAT D'HOSPITALITZACIÓ .....	4

DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
Procediment d'actuació COVID. Protocol de desallament hospitalari de pacients COVID positiu o considerats contacte estret. Propera revisió: octubre 2024	CSPT-COV-027	14/10/2020		Pàg. 3 de 4

## 1. INTRODUCCIÓ

Aquest protocol té per objecte disposar d'un guia clara que permeti vetllar per la seguretat dels pacients i, alhora, ubicar-los en aquells espais més adequats per a la seva situació clínica, un cop han superat la infecció per SARS-COV2 o el període d'aïllament fruit d'un contacte estret.

## 2. DESAÏLLAMENT DELS PACIENTS COVID POSITIU I /O TRASLLAT A ALTRES ÀREES DE L'HOSPITAL.


Els requeriments per al trasllat dels pacients de les àrees COVID a NO COVID dependran de la gravetat de la infecció per SARS-CoV-2

En tot pacient COVID19 que es sol·liciti PCR seguiment s'indicarà al formulari de la petició electrònica com a "CONTROL COVID POSITIU" per tal de processar la mostra per la tècnica que mesura els Cicles d'amplificació de la PCR.

- **Infecció ASIMPTOMÀTICA** ( detectada per cribatge) es pot traslladar a àrea NO COVID als 10 dies de la PCR diagnòstica si la serologia ( Ig G) és positiva.
- **Infecció símptomes lleus en pacients immunocompetents:** Es pot traslladar a àrea NO COVID a partir dels 14 dies dels primers símptomes, sempre i quan faci 72h de la desaparició de la febre, hi hagi millora clínica i tingui serologia Ig G positiva.
- **Infecció símptomes moderats/severs (pneumònia) i /o immunodeprimits:** es pot traslladar a àrea NO COVID a partir dels 28 dies des de l'aparició dels primers símptomes, sempre i quan hagi millorat clínicament (mínim 72 h asimptomàtics i afebrils) i tingui i serologia (IgG) positiva
  - Si serologia es negativa, determinada un cop passats els dies recomanats, es realitzarà una PCR
    - Si PCR negativa, es considerarà infecció passada.
    - Si PCR positiva. Es repetirà PCR **per la tècnica que permet mesurar el llindar de cicles**
      - Si > 35 cicles es considerarà infecció passada. **S'informarà com a negativa**
      - Si < 35 cicles es considerarà infecció activa i es repetirà la serologia en 7 dies. **S'informarà com a positiva.**

### Definició immunodeprimit

- Quimioteràpia activa / tractament immunosupressor( a valorar individualment. Especial alerta amb rituximab)
- trasplantat amb teràpia immunosupressora

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment d'actuació COVID. Protocol de desaiïllament hospitalari de pacients COVID positiu o considerats contacte estret. Propera revisió: octubre 2024	CSPT-COV-027	14/10/2020		

- VIH amb CD4 < 200 cel/mm<sup>3</sup>
- Immunodeficiència primària
- corticoides >20 mgr/dia durant > 14 dies
- \*\*No hi ha evidència que l'edat justifiqui fer un abordatge diferent de les mesures de desaiïllament \*\*

### **3. DESAÏLLAMENT DE PACIENTS ASSIMPTOMÀTICS CONTACTE ESTRET DE PACIENT COVID POSITIU**

El pacient haurà de romandre 14 dies en aïllament a l'habitació. Serà tractat a efectes del maneig com pacient amb sospita de COVID. No es necessari el trasllat a planta COVID. Caldrà PCR prèvia negativa abans d'aixecar l'aïllament si segueix ingressat o ha de seguir tractament hospitalari (Diàlisi, Hospitals de Dia...)

### **4. CRIBRATGE EN PREOPERATORI DE PACIENT POSTCOVID**

Si el pacient ha tingut infecció per COVID confirmada en els darrers tres mesos:  
SEROLOGIA

- Si serologia positiva no caldrà fer res més
- Si serologia negativa, es realitzarà PCR

Si el pacient ha tingut infecció per COVID confirmada en un període superior a 3 mesos : PCR I SEROLOGIA

### **5.-CRIBRATGE EN PACIENTS POSTCOVID QUE INGRESSEN A UNITAT D'HOSPITALITZACIÓ**

PCR I SEROLOGIA en tots els casos, i si PCR positiva es mantindrà en aïllament fins tenir el resultat de la serologia. Si serologia positiva es podrà desaiïllar.