

 Parc Taulí Hospital Universitari	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització	CSPT-COV-034	21/01/2021		Pàg. 1 de 15
	Propera revisió: gener 2024				

PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES UNITATS D'HOSPITALITZACIÓ.

ELABORAT PER:	REVISAT PER:	APROVAT PER:
Nom i cognoms. Descripció professional Llum Veiga Díaz. Cap de neteja i rober	Gemma Navarro Rubio. Metge Unitat d'epidemiologia i avaluació. Anna Augé Ruiz. Infermera de Metodologia	Comitè Executiu COVID. Maria Reventós Gil de Biedma. Coordinació
21/01/2021	21/01/2021	21/01/2021

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització	CSPT-COV-034	21/01/2021		Pàg. 2 de 15
	Propera revisió: gener 2024				

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	3
2.OBJECTIUS	3
3.USUARIS DIANA	3
4. ASPECTES GENERALS PER LA NETEJA I DESINFECCIÓ.....	3
4.1 Mètode de neteja.....	4
4.2 Sistemes de neteja	4
4.2.1 Sistema neteja horitzontal (TWIXTER) (cubell banyera amb pedal.....	4
4.2.2 Sistema : doble cubell	6
5. PRODUCTES PER LA NETEJA I DESINFECCIÓ.....	8
5.1 Recomanacions per a obtenir una màxima eficàcia dels productes de neteja i desinfectants	8
5.2. Dosificació de productes de neteja del medi hospitalari	1
6. NORMES GENERALS EN CAS DE COVID-19.....	1
7. NETEJA SEGONS CLASSIFICACIÓ DE LES ZONES DE RISC	2
7.1. Procediments de neteja general o diària.....	2
7.2. Procediment neteja a fons.....	3
8. BIBLIOGRAFIA	4

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització	CSPT-COV-034	21/01/2021		Pàg. 3 de 15
	Propera revisió: gener 2024				

1. INTRODUCCIÓ

La **neteja** és un procediment d'arrossegament i eliminació de la brutícia i de la matèria orgànica present en l'objecte o superfície que es vol netejar. Es realitza mitjançant aigua, detergents i acció mecànica. Sempre ha de precedir a la desinfecció.

La **desinfecció** és el procés en el que, mitjançant productes químics, es destrueixen els microorganismes, però no necessàriament totes les espores bacterianes dels objectes i de les superfícies.

En funció del tipus i nombre de microorganismes que un desinfectant sigui capaç de destruir, es parlarà de desinfectant d'alt, mig o baix nivell.

Cal recordar que la finalitat de la neteja en un centre hospitalari és controlar la contaminació per aconseguir un ambient i unes superfícies el més lliures possibles de microorganismes.

2.OBJECTIUS

Conèixer el mètode de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització ja siguin COVID-19 o No COVID-19.

3.USUARIS DIANA

Personal de neteja de la institució.

4. ASPECTES GENERALS PER LA NETEJA I DESINFECCIÓ.

- Netejar sempre amb guants de goma.
- Assegurar d'entrar amb calçat institucional subjecta al peu.
- Col·locar al començament de la neteja l'avís de " terra moll" i deixar-lo col·locat fins que estigui sec. Col·locar un altre al començament de la següent neteja i així successivament s'anirà alternant.
- El material de neteja que s'utilitzi ha de ser l'específic per cada zona.
- No escombrar mai, si és necessari, recollir la brossa amb mopa o protegint el raspall amb tèxtil humit, o paper teixit.
- Treure la pols amb draps humits.
- Abans d'iniciar la neteja general recollir la matèria orgànica (sang i altres fluïts) sense escampar-los per la resta de les superfícies que es netegen.
- En finalitzar la neteja d'una habitació o espai i abans d'entrar en una altre, caldrà friccionar els guants amb el mateix producte desinfectant que es fa servir per desinfectar el bany.

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització	CSPT-COV-034	21/01/2021		Pàg. 4 de 15
	Propera revisió: gener 2024				

- Cada vegada que es treguin els guants caldrà fer una higiene de les mans abans de procedir a fer una altra activitat i al començament i finalització del torn de treball.
- El material utilitzat per la neteja cal deixar-lo net i desinfectat, sec i ben escorregut.
- Es recomana treballar sense joies.

4.1 Mètode de neteja.

Per tal de seguir un procediment adequat per dur a terme la neteja dels diferents espais, és important seguir un mètode i unes indicacions generals comuns per tots els espais i sistemes de neteja que utilitzem.

1. Posar-se els guants.
2. Col·locar avís de "terra moll".
3. Retirar tots els objectes que puguin dificultar la neteja.
4. Retirar residus i roba bruta (si s'escau).
5. Recollir el material del terra amb l'ajut d'una mopa (fliselinna) o pal de vidres, depenent de la zona per evitar aixecar pols.
6. Eliminar les taques de sang i altres fluïts orgànics, si s'escau, amb un paper o drap d'un sol ús.
7. Netejar sempre de net a brut, de dalt a baix i de dins a fora.
8. Tenir cura especial amb els poms de les portes i rodes del mobiliari i superfícies properes a l'usuari.


4.2 Sistemes de neteja

Actualment la CCSPT utilitza dos sistemes de neteja: el sistema horitzontal i el doble Cubell.

4.2.1 **Sistema neteja horitzontal (TWIXTER) (cubell banyera amb pedal).**

El sistema de neteja horitzontal o "mopes" i baietes impregnades reutilitzables, està compost per:

- Tiràs sec de fiselina rebutjable.
- "Mopa" de microfibra intercanviable i reutilitzable.
- Cubell banyera amb pedal.
- Baietes microfibres reutilitzables.

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització Propera revisió: gener 2024	CSPT-COV-034	21/01/2021		



Amb la finalitat d'evitar possibles transmissions de bacteries entre les diferents àrees, les mopes i baietes reutilitzables es rebutjaran per ser rentades un cop utilitzades en cada habitació.

Àrees on s'utilitzen: s'utilitzen a totes les àrees de la CCSPT, excepte a àrees quirúrgiques, àrees de malalt crític, sala de parts, àrees de Neonats, àrees de RX.

Preparació "mopes" per neteja de paviments :

- Preparar a la cubeta gris 8 litres d'aigua amb el desinfectant corresponent (**).
- Col·locar a sobre la reixeta de la galleda la "mopa" i accionar el pedal tantes vegades com necessitat tinguem de nivell d'humitat. Un cop mullada deixar-la escórrer una mica i procedir a fer un camí central d'aigua a partir del qual anirem netejant a un costat i a l'altre de forma que anem agafant l'aigua del camí.
- Per norma general anirem canviant la posició de la "mopa" cada m² aproximadament, de la cara bruta humitejada amb el desinfectant (ratlles blaves) a la cara neta i blanca, així successivament fins a finalitzar tot l'espai. Un cop finalitzat posarem la "mopa" per rentar.

(**) Aquesta quantitat d'aigua amb producte és la corresponent a 15 "mopes", en cas d'altres quantitats caldrà fer la proporció adient per cada "mopa": **500 ml** aproximadament d'aigua amb desinfectant.

Preparació baietes per neteja mobiliari:

- Preparar a la galleda blava 1,250 litres d'aigua amb lleixiu al 0.5 % i a la galleda vermella 1,250 ml d'aigua amb lleixiu a l'1% (*).
- Submergir les baietes dins les galledes corresponents i deixar-les col·locades fins que agafin la quantitat d'humitat necessària.

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització	CSPT-COV-034	21/01/2021		Pàg. 6 de 15
	Propera revisió: gener 2024				

- Netejar amb la baieta doblegada a 8 cares, i anar canviant de cara segons la brutícia, un cop utilitzades totes les cares de la baieta posar-les a rentar.
- (*) Aquesta quantitat d'aigua amb producte és la corresponent a 15 baietes, en cas d'altres quantitats caldrà fer la proporció adient per cada baieta: **80ml** d'aigua aproximadament amb desinfectant.
- Tenir cura de netejar les rodes i/o peus del mobiliari i/o aparell al finalitzar la neteja del mateix.

Preparació baietes/"borreguito" per neteja de sostres i parets :

- Preparar a la cubeta gris, 8 litres d'aigua amb el desinfectant corresponent (**), mullar el "borreguito" o baieta amb el pal extensible, escorre'l a sobre la reixeta de la galleda, i procedir a passar-lo per la superfície a netejar.
- Per norma general a cada metre lineal aproximadament, esbandirem el "borreguito"/baieta i tornarem a començar de nou.
- Un cop finalitzat rentarem el "borreguito" /baieta i el deixarem assecar penjat a la buida.
- (**) Aquesta quantitat d'aigua amb producte és la corresponent a uns 24 m² de parets o sostres, si tenim la necessitat de continuar haurem de canviar l'aigua amb desinfectant cada m² equival a 330 ml d'aigua amb desinfectant.

4.2.2 Sistema : doble cubell

La tècnica de neteja de doble cubell fa que el fregat sigui més eficient al garantir que l'aigua bruta i neta no es barregin a l'hora de fregar.

El sistema del doble cubell està compost per:

- Tiràs sec fiselina rebutjable.
- Cubells per terres (2 de 7/8 litres).
- Cubell per superfícies (2 de 3 litres).
- Baietes microfibres reutilitzables.
- Baietes de pal



	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització	CSPT-COV-034	21/01/2021		Pàg. 7 de 15
	Propera revisió: gener 2024				

Àrees on s'utilitzen: àrees quirúrgiques, àrees de malalt crític, sala de parts, àrees de Neonats, àrees de RX.

Preparació galledes per neteja de paviments :

- Preparar aigua i desinfectant a la galleda blava i aigua neta a la galleda vermella.
- Submergir la baieta de pal a la galleda blava, escorre-la i passar-la per la superfície a netejar, deixar actuar, mentrestant esbandim la baieta de pal a l'aigua de la galleda vermella.
- Tornar a submergir-la a la galleda blava i un cop esbandida tornar novament a la galleda vermella.
- Canviar l'aigua de les galledes, en funció de la brutícia tantes vegades com sigui necessari per mantenir l'aigua neta. Com a norma general es renova l'aigua en cada habitació, box, quiròfans, etc.

Preparació galledes per neteja mobiliari:

- Preparar aigua i desinfectant a la galleda blava i aigua neta a la galleda vermella.
- Submergir la baieta a la galleda blava, escorre-la i passar-la per la superfície a netejar, deixar actuar, mentrestant esbandim la baieta a l'aigua de la galleda vermella. Tornar a submergir-la a la galleda blava i un cop esbandit tornar novament a la galleda vermella.
- Canviar l'aigua de les galledes, en funció de la brutícia tantes vegades com sigui necessari per mantenir l'aigua neta. Com a norma general es renova l'aigua en cada habitació, box, quiròfans...
- Tenir cura de netejar les rodes i peus del mobiliari al finalitzar la neteja de l'aparell i/o mobiliari que s'està netejant.

Preparació baietes/"borreguito" per neteja sostres i parets :

- Preparar en la cubeta gris , 8 litres d'aigua amb el desinfectant corresponent (**).
- Mullar el "borreguito" o baieta amb el pal extensible, escorre'l a sobre la reixeta de la galleda, i procedir a passar-lo per la superfície a netejar.
- Per norma general per cada metre lineal aproximadament, esbandirem el borreguito/baieta i tornarem a començar de nou.
- Un cop finalitzat rentarem el borreguito/baieta i el deixarem assecar penjat a la buida.

()** Aquesta quantitat d'aigua amb producte és la corresponent a uns 24 m² de parets o sostres, si tenim la necessitat de continuar haurem de canviar l'aigua amb desinfectant cada m² equivalent a 330 ml d'aigua amb desinfectant.

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització	CSPT-COV-034	21/01/2021		Pàg. 8 de 15
	Propera revisió: gener 2024				

5. PRODUCTES PER LA NETEJA I DESINFECCIÓ

La Comissió d'Infeccions de la CCSPT seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat, ha optat per utilitzar:

- Hipoclorit Sòdic + detergent (Maxiclòr) (superfícies baix i mig risc
- AMINOPROPYL-DODECYLPROPANE-DIAMINE-CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO (Surfanios Premium) per superfícies de risc

5.1 Recomanacions per a obtenir una màxima eficàcia dels productes de neteja i desinfectants

- Les dilucions i posterior envasat dels productes es farà de forma centralitzada en els llocs on es disposa de dispensadors.
- Preparar les solucions en les concentracions adients.
- Preparar les solucions en recipients nets i sense restes del producte.
- Un cop finalitzat el torn es deixaran netes pel torn següent (No reomplir mai les ampolles).
- Els envasos que continguin solucions desinfectants han d'estar sempre tapats i ben etiquetats.
- Les dilucions dels productes a base de lleixiu o de clor, caduquen a les 24 hores, encara que hagin estat ben tapats.
- L'estabilitat dels desinfectants és variable. Cal protegir-los de la llum i de les fonts de calor.
- No utilitzar productes que han estat oberts.
- Aplicar-los ruixant directament sobre la superfície que s'ha de netejar o de desinfectar o mitjançant baietes impregnades prèviament.
- S'ha de tenir en compte la compatibilitat del desinfectant amb la superfície o objectes que s'han de desinfectar.
- Els desinfectants es poden inactivar quan hi ha matèria orgànica, per tant és imprescindible la neteja prèvia amb aigua .
- La dilució es farà mitjançant el dosificador automàtic (es col·locaran guants i ulleres, sempre que ho indiqui la fitxa de seguretat del producte).

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització	CSPT-COV-034	21/01/2021		Pàg. 1 de 15
	Propera revisió: gener 2024				


5.2. Dosificació de productes de neteja del medi hospitalari

SUPERFÍCIE A NETEJAR	SISTEMA NETEJA	NOM DEL PRODUCTE	CONCENTRACIÓ PRODUCTE	DOSIFICACIÓ PRODUCTE	TIPUS DE DOSIFICACIÓ	CUBETA DE TREBALL/ AMPOLLA	OBSERVACIONS
CUINES HOSPITALÀRIES	HORIZONTAL	DESINFECTANT CLORAT (Maxiclor)	1%	118 ml/litre aigua	Dosificador paret automàtic	Ampolla serigrafiada banda blau	Directe de l'ampolla a superfícies cuina
WC DE TOTES LES ZONES GENERALS I CRÍTQUES	HORIZONTAL	DESINFECTANT CLORAT (Maxiclor)	1%	118 ml/litre aigua	Dosificador paret automàtic	Ampolla serigrafiada banda vermella	Directe de l'ampolla dins el WC
AÏLLAMENTS (SUPERFÍCIES I MOBILIARI)	HORIZONTAL	DESINFECTANT CLORAT (Maxiclor)	1%	118 ml/litre aigua	Dosificador paret automàtic	Cubeta amb baietes impregnades	Cubeta del carro amb 800ml d'aigua per cada 10 baietes d'impregnació a la concentració de producte establert per cada superfície a netejar.
PAVIMENTS I PARETS, SOSTRES (zones generals i habitacions aïllaments)	HORIZONTAL	DESINFECTANT CLORAT (Maxiclor)	0,1%	11,8 ml/litre aigua	Dosificador paret automàtic	Cubeta amb mopes impregnades	Cubeta gris del carro de neteja amb 8lt d'aigua per impregnació de les mopes a la concentració de producte establert per les superfícies a netejar (aprox. 760ml=15 mopes)

SUPERFÍCIE A NETEJAR	SISTEMA NETEJA	NOM DEL PRODUCTE	CONCENTRACIÓ PRODUCTE	DOSIFICACIÓ PRODUCTE	TIPUS DE DOSIFICACIÓ	CUBETA DE TREBALL/ AMPOLLA	OBSERVACIONS
SUPERFÍCIES MOBILIARI I ZONES GENERALS (inclòs pantalles)	HORIZONTAL	DESINFECTANT CLORAT (Maxiclor)	0,5%	59 ml/litre aigua	Dosificador paret automàtic	Cubeta amb baietes impregnades	Cubeta del carro amb 800ml d'aigua per cada 10 baietes d'impregnació a la concentració de producte establert per cada superfície a netejar.
Superfícies I MOBILIARI ZONES CRITIQUES (excepte zones comuns exteriors als quiròfan)	DOBLE CUBELL	AMINOPROPYL-DODECYLPROPANE-DIAMINE-CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO (Surfanios Premium)	0,25%	2,5m/l	Dosificador paret automàtic	Cubell blau-vermell	Cubell vermell amb 6 l d'aigua (15ml)
TERRES PLÀSTIC (ZONES MIG RISC)	HORIZONTAL	G3 DESINFECTANT DE SUPERFÍCIES	5 % superfícies netes i 10% superfícies brutes	50 ml/litre d'aigua en superfícies netes i 100 ml/litres s'aigua ens superfícies brutes	Dosificació manual	Cubeta amb mopes impregnades	Cubeta gris del carro de neteja amb 8l d'aigua per impregnació de les mopes a la concentració de producte establert per les superfícies a netejar (aprox. 760ml=15 mopes)

SUPERFÍCIE A NETEJAR	SISTEMA NETEJA	NOM DEL PRODUCTE	CONCENTRACIÓ PRODUCTE	DOSIFICACIÓ PRODUCTE	TIPUS DE DOSIFICACIÓ	CUBETA DE TREBALL/ AMPOLLA	OBSERVACIONS
NETEJA CADIRES DE ROBA	DOBLE CUBELL	AMONIACAL PERFUMAT	4%	50 ml/litre d'aigua	Dosificació manual	Directe al cubell	Deixar actuar abans de treure'l i deixar assecar
NETEJA MATERIALS LABORATORI	DOBLE CUBELL	EXTRA MA 03	100% Producte	50ml/litre d'aigua	Dosificació manual	Directe a la pica	Directe a la pica
DECAPANT TERRES DURS		TASKI JONTEC NÚM 1	10% superfícies normals	100 ml/litre d'aigua	Dosificació manual	Cubell blau	Ampolla amb producte diluït i polvoritzat al terra
			25% superfícies brutes	250 ml/litre d'aigua			
ABRILLANTADOR TERRES PLASTICS		TASKI JONTEC ETERNUM	100% Producte	25 ml/m2	Dosificació manual	Directe al terra	Cera directa al cubell i aplicació amb pal de fregar
CRISTALITZADOR DE TERRES DURS		TASKI JONTEC TERRANOVA	100% Producte	3 polvoritzacions per m2	Dosificació manual	Directe al terra	Directe al terra

Àrea RX (tot amb lleixiu excepte vaculars que es fa amb amonis)	Àrea UCI/Semis tot amb lleixiu excepte boxes que es fan amb amonis (inclòs el portàtil de RX)	Àrea CQA tot amb amonis excepte àrees comuns que es fan amb lleixiu (part exterior)	Sala de Parts (tot amb amonis excepte àrees comuns externes que es fan amb lleixiu)	Àrea Neonatal (tot amb amonis excepte WC que es fan amb lleixiu)	Àrea BQC (tot amb amonis excepte part exterior que es fa amb lleixiu)
--	--	--	--	---	--

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització	CSPT-COV-034	21/01/2021		Pàg. 1 de 15
	Propera revisió: gener 2024				

6. NORMES GENERALS EN CAS DE COVID-19

Cal extremar la higiene de mans, rentar-se les mans abans d'entrar i sortir de l'habitació.

La neteja de les habitacions/espais comuns s'ha de fer sempre amb lleixiu al 0,5%.

Tal i com es fa amb les habitacions dels pacients amb aïllament per gotes i aire s'han de ventilar durant la neteja assegurant que no es produeixen corrents d'aire (amb la finestra oberta sempre i mantenint la porta tancada).

El material de neteja que s'utilitzi ha de ser l'específic per cada zona, igual que habitualment i segons el quadre dosificació de productes de neteja del medi hospitalari (punt 5.2).

En cas d'àrees senceres d'aïllament per COVID-19 s'ha d'utilitzar el mateix producte però diluït al 0,5%.

No entrar el carro dins les habitacions /estàncies a netejar, i fer una preparació prèvia dels materials que s'han d'utilitzar a l'avantsala de l'habitació.

1. Preparació prèvia de materials a l'avantsala de l'habitació en cas de COVID-19.
2. En una altra bossa col·locar: 1 baieta blava neta i 1 "mopa" neta tot sempre impregnat amb el producte adient segons quadre dosificació de productes de neteja del medi hospitalari (punt 5.2) més 1 bossa de residus grup –II (negra),
3. En una altra bossa col·locar: 1 baieta blava neta i 1 "mopa" neta tot sempre impregnat amb el producte adient segons quadre dosificació de productes de neteja de les àrees de dosificació (punt 4.3.), més 1 bossa de residus grup –II (negra),
4. Agafar el pal de la " mopa".
5. Col·locar avís de "terra moll" (avantsala).

Nota: Les habitacions es consideraran d'aïllament a tots els efectes, no així els espais comuns que es consideraran zones netes.

En relació a la utilització dels EPI i material de protecció.

- Utilitzarem una bata de protecció al damunt de l'uniforme institucional durant la neteja de les habitacions/boxes ocupades amb pacient COVID-19.
- Utilitzarem la mateixa bata per anar d'habitació en habitació, i ens la canviarem aproximadament ,cada 4 habitacions.
- En cas de la neteja d'habitacions on indica que el pacient a més de COVID-19 tenen un aïllament per infecció o colonització per bacteris multiresistents (MRSA, AB, KR, CD, ERV, PAR) ho farem amb una bata de protecció, d'ús exclusiu , que col·locarem a rentar al sortir de l'habitació.

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització	CSPT-COV-034	21/01/2021		Pàg. 2 de 15
	Propera revisió: gener 2024				

- Utilitzarem els EPI i les proteccions completes (bata impermeable, protecció ocular, guants i protecció respiratòria), en tots els procediments de neteja que comportin fer sostres i parets a fons de les àrees COVID-19.

7. NETEJA SEGONS CLASSIFICACIÓ DE LES ZONES DE RISC

Procediment segons el tipus de neteja e indicacions

S'estableixen diferents tipus de neteja segons els riscos que determinats nivells de contaminació ambiental puguin suposar pels usuaris:

a) Indicacions neteja general ó diària :

- A totes les àrees de la CSPT.
- El començament de l'activitat quirúrgica.
- Neteja entre intervencions (àrees quirúrgiques).
- Neteja diària o final d'activitat (àrees quirúrgiques).
- En tots els procediments de neteja diària de les unitats d'hospitalització COVID-19 i No COVID-19.

b) Indicacions neteja a fons :

- Periòdicament a totes les àrees generals.
- Setmanalment a tots els quiròfans.
- Després d'una intervenció contaminada.
- A l'alta del pacient hospitalitzat.
- A l'alta del pacient aïllat.
- Puntualment després de qualsevol adequació d'espais o obra.
- Netejes específiques.
- Qualsevol altre que s'indiqui.

7.1. Procediments de neteja general o diària.

1. Rentar-se les mans.
2. Posar-se guants.
3. Col·locar avís de "terra moll".
4. Obrir les finestres i tancar-les un cop finalitzat el procés de neteja.
5. Retirar residus WC.
6. Recollir matèria orgànica dels terres si s'escau (cubell amb aigua).
7. Passar la "mopa" (fliselina) pels terres.
8. Netejar les superfícies horitzontals : capçal i llit, tauletes, cadires, monitors, poms i rodes, mitjançant baieta de color blau amb desinfectant .

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització	CSPT-COV-034	21/01/2021		Pàg. 3 de 15
	Propera revisió: gener 2024				

9. Repàs ditades finestra i aire condicionat si s'escau .
10. Fregar el terra amb el sistema establert (moure els accessoris que calgui).
11. Netejar tots els elements del bany, inclòs repàs de la paret fins a l'alçada de 150cm, amb la baieta de color vermell, segons quadre dosificació de productes de neteja del medi hospitalari (punt 5.2.)
12. La tassa del WC es netejarà amb baieta color rosa i lleixiu a l'1% , amb ampolla serigrafiada amb banda vermella .
13. Es finalitzarà realitzant la neteja del terra amb producte segons quadre dosificació de productes de neteja del medi hospitalari (punt 5.2.)
14. Rentar-se les mans (guants) al finalitzar la neteja. En cas que no continuem fent la neteja d'altre espai un cop rentat els guants s'ha de procedir a rentar-se les mans.
15. Deixar col·locat l'avís de terra moll, mentre es procedirà a la següent habitació/espai.

Nota: Amb el terra net de l'espai netejat procedir a fer el canvi de "mopa".

7.2. Procediment neteja a fons.

1. Rentar-se les mans
2. Posar-se guants.
3. Col·locar avís "terra moll".
4. Obrir les finestres i tancar-les un poc finalitzat els procés de neteja (hospitalització)
5. Retirar tots els aparells i roba del llit (infermeria).
6. Retirar residus i cortina (netejadora).
7. Recollir matèria orgànica dels terres, si s'escau.
8. Passar la mopa pel terra.
9. Netejar superfícies verticals: sostre amb reixes aire condicionat i llums incloses.
10. Netejar la finestra i persiana si s'escau.
11. Netejar les parets mitjançant pal telescòpic amb mullader de vidre (borreguito).
12. Netejar les superfícies horitzontals amb baieta color blau segons el sistema establert (armaris capçal i llit, tauletes, cadires, rodes, monitors, poms i porta
13. Netejar el bany, amb baieta de color vermell segons el quadre dosificació de productes de neteja de les àrees (punt 5.2.), inclòs tots els elements, parets i sostre.
14. Netejar els terres amb sistema establert per la superfície a netejar, segons el quadre dosificació de productes de neteja de les àrees de dosificació (punt 5.2.)
15. Rentar-se les mans (guants) un cop finalitzada la neteja .

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	
	Procediment de neteja i desinfecció de les unitats d'hospitalització	CSPT-COV-034	21/01/2021		Pàg. 4 de 15
	Propera revisió: gener 2024				

8. BIBLIOGRAFIA

- Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. *La neteja als Centres Sanitaris*. 2010.
- <http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2100/netejacentres.pdf>
- Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. *Precaucions i mesures d'aïllament per evitar la transmissió de les infeccions als centres sanitaris*. 2009.
- *Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities* (Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Juny 2003.
- <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5210a1.htm>