



Instrucciones de uso de la adrenalina autoinyectable



1 Sujetar el autoinyector con la mano dominante, con el pulgar junto al tapón de seguridad gris.

2 Con la otra mano quitar la tapa gris de seguridad gris.



3 Pinchar firmemente en la parte exterior del muslo, a través de la ropa si es necesario.



4 Mantener en esa posición durante 10 segundos.

5 Masajear la zona de la inyección durante 10 segundos.

6 Llamar a un servicio de emergencias: tel. 112.

7 Administrar un segundo autoinyectable de Adrenalina al cabo de 15 min. si el paciente no responde o reaparecen los síntomas originales.

8 Recuerde reemplazar los autoinyectables de adrenalina utilizados o caducados.

Adrenalina

● La vía intramuscular (IM) es la vía de elección en el tratamiento inicial de la anafilaxia en cualquier situación (cara anterolateral del muslo).

● Dosis (1 mg = 1 ml de adrenalina en solución acuosa 1/1.000).
- Adultos: 0,3 a 0,5 mg.
- Lactantes y niños: 0,1 mg / 10 kg, máximo 0,3 mg.

● Puede repetirse cada 5 a 15 minutos según la gravedad y tolerancia del paciente.

Altellus® Altellus® niños

(Adrenalina) Autoinyectable 0.3 mg - 0.15 mg

Anafilaxia

UGC Neumología-Alergia
Hospital de Jerez

MEDA
www.meda.es/altellus