

# SOLUCIÓN EVACUANTE PARA COLONOSCOPIAS PLEINVUE®

PRUEBA MAÑANA

La caja de Pleinvue® contiene **3 sobres**:



El sobre DOSIS 1  
corresponde a la  
**DOSIS 1**



Los sobres A y B juntos  
corresponden a la  
**DOSIS 2**

## Dónde recoger el Pleinvue®

Si la prueba la ha programado el **médico del CAP**, lo tienes que **recoger en el CAP**.

Si la prueba la ha programado un **especialista del hospital**, lo tienes que **recoger en el hospital**.

*(Edificio Taulí, planta baja, en el mostrador de información, de 8 a 20h, de lunes a viernes, sin coger tiquet)*


## Cuándo tomar las dosis

Si la prueba es por la **MAÑANA** (de 8:00 a 15:00h)

- La **DOSIS 1** se toma a las 20 o 21h del día antes.
- La **DOSIS 2** se toma 4 horas antes de la prueba.
- **No beber nada** 2 horas antes de la prueba.

Por ejemplo, si la prueba es a las **12:00h**:

- **DOSIS 1**: a las **20:00 o 21:00h del día antes**.
- **DOSIS 2**: a las **8:00h del día de la prueba**.
- **No beber nada** a partir de las **10:00h**.



## Cómo tomar las dosis



Es importante seguir estas pautas para evitar náuseas y vómitos

### DOSIS 1 A LAS 20-21H EL DÍA ANTES



1. Disolver el sobre de la DOSIS 1 en **500 ml** (medio litro) de **agua fría**.



2. Tomar **un vaso** de la dosis **cada 15 minutos**, hasta que se acabe.

3. Cuando se acabe, esperar **10 minutos** y beber **500 ml de agua normal o líquidos claros**.

### DOSIS 2 4 HORAS ANTES



1. Disolver los sobres A y B de la DOSIS 2 en **500 ml** (medio litro) de **agua fría** y repartir en **4 vasos**.

2. Repartir **500 ml de agua normal** en **4 vasos** más.

3. Lentamente, tomar **1 vaso cada 15 minutos**, **alternando dosis y agua**, hasta acabar los 8 vasos.

