

SOLUCIÓN EVACUANTE PARA COLONOSCOPIAS PLEINVUE®

PRUEBA TARDE

La caja de Pleinvue® contiene **3 sobres**:



El sobre **DOSIS 1** corresponde a la **DOSIS 1**



Los sobres A y B juntos corresponden a la **DOSIS 2**

Dónde recoger el Pleinvue®

Si la prueba la ha programado el **médico del CAP**, lo tienes que **recoger en el CAP**.

Si la prueba la ha programado un **especialista del hospital**, lo tienes que **recoger en el hospital**.

(Edificio Taulí, planta baja, en el mostrador de información, de 8 a 20h, de lunes a viernes, sin coger tiquet)

Cuándo tomar las dosis

Si tienes la prueba por la **TARDE** (de 15:00 a 20:00h)

- La **DOSIS 1** se toma 7 horas antes de la prueba.
- La **DOSIS 2** se toma 4 horas antes de la prueba.
- **No beber nada** 2 horas antes de la prueba.

Por ejemplo, si la prueba es a las **17:00h**:

- **DOSIS 1**: a las **10:00h**.
- **DOSIS 2**: a las **13:00h**.
- **No beber nada** a partir de las **15:00h**.



Cómo tomar las dosis



Es importante seguir estas pautas para evitar náuseas y vómitos

DOSIS 1

7 HORAS ANTES



1. Disolver el sobre de la DOSIS 1 en **500 ml** (medio litro) de **agua fría**.



2. Tomar **un vaso** de la dosis **cada 15 minutos**, hasta que se acabe.

3. Cuando se acabe, esperar **10 minutos** y beber **500 ml de agua normal o líquidos claros**.

DOSIS 2

4 HORAS ANTES



1. Disolver los sobres A y B de la DOSIS 2 en **500 ml** (medio litro) de **agua fría** y repartir en **4 vasos**.

2. Repartir **500 ml de agua normal** en **4 vasos** más.



3. Lentamente, tomar **1 vaso cada 15 minutos**, **alternando dosis y agua**, hasta acabar los 8 vasos.

